

Californiline

Το Californiline περιέχει τα αρπακτικά ακάρεα *Amblyseius californicus* σε μίγμα σιτηρών και βερμικουλίτη. Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη για τον έλεγχο διαφόρων ακάρεων, συμπεριλαμβανομένου και του **Τετράνυχου (*Tetranychus urticae* και *T. Cinnibarinus*)**.



Αρπακτικό άκαρι

- Δραστήριο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής υγρασίας
- Αρπακτικό ευρέως φάσματος το οποίο διατρέφεται με γύρη και άλλα αρθρόποδα
- Παραμένει στην καλλιέργεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλα αρπακτικά του τετράνυχου

Γενικές πληροφορίες

Το *Amblyseius californicus* παρέχει ικανοποιητικό έλεγχο του τετράνυχου. Συνίσταται η χρήση του σε περιοχές με ξηροθερμικές συνθήκες, στις οποίες το *Phytoseiulus persimilis* αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν αρκετά ακαρεοκτόνα συμβατά με τη χρήση του *Amblyseius californicus*, όπως η δραστική hexithiazox. Τα ξηρά υπολείμματα της δραστικής ουσίας abamectin δεν είναι άμεσα τοξικά, αλλά η διατροφή του με δηλητηριασμένο τετράνυχο ίσως προκαλέσει το θάνατό του. Η δραστική αυτή ουσία χρησιμοποιείται συνήθως στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου (ετήσιες καλλιέργειες) για τη μείωση των πληθυσμών τετράνυχου ή προς το τέλος. Χρειάζεται προσοχή στη χρήση του θειαφιού.

Οδηγίες Χρήσης

4-20 *Amblyseius californicus*/m², σε μια ή περισσότερες εξαπολύσεις.

Αυξήστε στα 20 άτομα/m² σε σημεία έντονης προσβολής.

Διατηρήστε το προϊόν σε δροσερό μέρος και σε οριζόντια θέση μέχρι τη χρήση.

Αμέσως πριν τη χρήση χτυπήστε ελαφρά τη φιάλη, ώστε να ελευθερωθεί το εσωτερικό της φιάλης από ακάρεα και περιστρέψτε τη φιάλη ώστε να επιτύχετε καλύτερη ανάμιξη των ακάρεων με το υλικό μεταφοράς. Διασκορπίστε ομοιόμορφα το υλικό και τα ακάρεα σε φύλλα εντός της καλλιέργειας, κυρίως πάνω και γύρω από εστίες.

Αποθήκευση και Μεταφορά

ΟΧΙ έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως. Μεταφορά και αποθήκευση στους 6-10°C

Χρησιμοποιήστε το εντός 18 ωρών από την παραλαβή.