

ΑΙΤΗΣΗ

Καλλιέργεια	Εφαρμογές	Δόση [kg/ha]
Σιτηρά	Αρχή αδελφώματος	2+4
	Αύξηση βλαστού και στάχως	3+4,5
	Εμφάνιση στάχης και άνθησης Μετά την ανθοφορία	
Αμπέλι	Επιτραπέζιο: Μάκρεια, αραιώμα και 1ο-2ο χόντρεμα Οινοποιήσιμο: 2 εβδομάδες μετά την ανθοφορία	3+5
Πατάτα	Όταν τα φυτά έχουν 15 cm ύψος	3+4,5
	Πριν την ανθοφορία Μετά την ανθοφορία	
Καλαμπόκα	Στάδιο 3-5 φύλλων	3+4,5
	Στάδιο 8-10 φύλλων	
Οσπρία	Πριν την ανθοφορία	3+4
	Μετά την ανθοφορία	
	7-10 ημέρες αργότερα	
Δέντρα και Θάμνοι	Πριν την ανθοφορία	5+10
	Μετά την ανθοφορία	
	10-14 ημέρες αργότερα	
Φυλλώδη	Γενική δόση για Ριζοτόπιασμα	30+50
	2-3 εβδομάδες μετά την έκπτυξη των νεαρών φυτών: 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες διαφορά	3+4
	Κηπευτικά Θερμοκηπίου Ταμάτα, πιπερία κλπ	Γενική δόση για Διαφυλλική Εφαρμογή
Ανθοκομικά	Γενική δόση για Ριζοτόπιασμα	30+50
	0,5-1,5 Kg/ λίπασμας ανά 100 λίτρα νερού	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:

Πριν τον ψεκασμό ετοιμάστε την τελική δεξαμενή πληρώνοντάς τη μέχρι τα 2/3. Στη συνέχεια προσθέστε με τη σειρά τα ακόλουθα: οξυρία, MAXIMUS διαλυμένο στο νερό με αναλογία 1:4, το φυτοπροστατευτικό (εάν είναι αναμείγμο). Αναδευείτε και εφαρμόστε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η διαδικασία ανάμιξης γίνεται σε θερμοκρασία μεγ. 25°C. Θερμοκρασία υγρού τουλάχιστον 10°C.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

- Προσέξτε τις συνθήκες αποθήκευσης
- Διάρκεια 5 ετών από την ημερομηνία παρασκευής



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία του. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση διαρροής, συλλέγουμε αμέσως το υλικό, και τα υπόλειμμα τα πλένουμε με νερό.

ΣΥΝΘΕΣΗ [% w/w]:

Αζωτο ολικό	(N)	20,0
Νιτρικό	(NO ₃)	4,2
Αμμόνιο	(NH ₄)	13,5
Αμμωνιακό	(NH ₄)	2,3
Φώσφορος		20,0
σε ουδέτερο διάλυμα κηφικού αμμωνίου και νερού υδατοδιαλυτός	(P ₂ O ₅)	20,0
Κάλιο υδατοδιαλυτό	(K ₂ O)	20,0
Βόριο υδατοδιαλυτό	(B)	0,051
Χαλκός	(Cu)	0,060
Χημικό σύμπλοκο με EDTA		0,110
Σίδηρος	(Fe)	0,110
Χημικό σύμπλοκο με DTPA		0,013
Μαγνήσιο	(Mn)	0,013
Χημικό σύμπλοκο με EDTA		0,001
Μολβδαίνιο υδατοδιαλυτό	(Mo)	0,040
Ψευδάργυρος	(Zn)	0,040
Χημικό σύμπλοκο με EDTA		0,040

Εύρος του pH για τη σταθερότητα των συμπλόκων: 3-7.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ, ΤΥΠΟΣ: B.1.1.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε μια θεμελιώδη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τη συνιστάσιμη δόση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

1 kg



εΡ
EKOPLON SA

Παρασκευάζεται και διανέμεται από την
EKOPLON SA
Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów, Poland
tel. (+48) 41 354 51 69, 354 52 59,
www.ekoplun.pl

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Anthesis Ε.Π.Ε.
Εμ.Μινεράκη 8,145 61 Κηφισιά
Τηλ. 210 80 12 367, Fax. 210 62 33 196
www.anthesis.gr