

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)



ACTIVATE Cu

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

pH : 4 - 5

Σύνθεση:

%β/β

Υδατοδιαλυτός Χαλκός (Cu) :
8%

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το λίπασμα ACTIVATE Cu παρέχει Φώσφορο, Άζωτο και Χαλκό στις καλλιέργειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ή και πρόληψη έλλειψης Χαλκού. Συστήνεται η χρήση του σε περιόδους ανθοφορίας, κατά τη φάση ανάπτυξης και σχηματισμού της ρίζας όπως και κάθε φορά που παρουσιάζεται έλλειψη Χαλκού. Η έλλειψη Χαλκού στο φυτό μπορεί να εμφανιστεί: από πλήρη απουσία του θρεπτικού στο έδαφος, λόγω δέσμευσής του από τα στοιχεία του εδάφους ή και εξ αιτίας μεγάλων αναγκών των φυτών σε Χαλκό.

Με την εφαρμογή του ACTIVATE Cu επιτυγχάνουμε:

- διαθεσιμότητα του φυτού σε Χαλκό, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα φυτοξικότητας
- εφοδιασμό του φυτού με Φώσφορο, χωρίς να επηρεάζεται η διαθεσιμότητα Χαλκού από την παρουσία του Φωσφόρου.

Το ACTIVATE Cu μπορεί να εφαρμοστεί διαφυλλικά και διαμέσου ριζοποτίσματος.

Αποθήκευση:

Τοποθετήστε το προϊόν σε σκιερό και δροσερό μέρος. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε, ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. **Πρώτες Βοήθειες - αντίδοτο:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: βγάλτε πρώτα τους φακούς επαφής. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν μετά το πλύσιμο

ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλέσετε εμετό. Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ** Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά και λιπάσματα. Να μη συνδυάζεται με βορδονάλειο πολύ. Σε περίπτωση νέων συνδυασμών με χημικά να γίνεται πρώτα δοκιμαστική εφαρμογή. **ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ** Να μη συνδυάζεται με προϊόντα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το ACTIVATE Cu μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη φυτών: κηπευτικά και δενδρώδεις καλλιέργειες.

Εφαρμογή με διαφυλλικούς ψεκασμούς και με ριζοπότισμα.

Εσπεριδοειδή: εφαρμόστε διαφυλλικά 2 - 3 φορές κατ' έτος με δόση 150 - 300 ml/100Lit. Για εφαρμογή με ριζοπότισμα προτείνεται ελάχιστη δόση 300 - 400 ml/στρ.

Γιγάρτοκαρπα, Πυρηνόκαρπα: εφαρμόστε διαφυλλικά 2 τουλάχιστον φορές ετησίως με δόση 150 - 300 ml/100Lit. Η 1^η εφαρμογή να γίνει πριν την άνθηση. Μπορούν να ακόμα 3-4 εφαρμογές σε διαστήματα των 15 ημερών. Για εφαρμογή μέσω άρδευσης η δόση είναι 300 - 400 ml/στρ. **Ελιά:** εφαρμόστε διαφυλλικά 2 τουλάχιστον φορές ετησίως με δόση 200- 300 ml/100Lit, η 1^η εφαρμογή το Φθινόπωρο και

η 2^η την Άνοιξη. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σε περιπτώσεις που ο απαιτούμενος όγκος ψεκαστικού υγρού είναι μικρότερος από 40Lit/στρ. Για εφαρμογή μέσω άρδευσης η δόση είναι 500- 700 ml/στρ. **Κηπευτικά:** εφαρμόστε διαφυλλικά 4 - 5 φορές σε διαστήματα των 8 ημερών, με τρόπο που οι εφαρμογές να συμπίπτουν με το στάδιο έντονης ανάπτυξης της ρίζας και πριν την άνθηση, με δόση 200 - 400 ml/100Lit. Για εφαρμογή μέσω άρδευσης η δόση είναι 300 - 400 ml/στρ. **Υδροπονία:** Εφαρμόστε δόση 50 - 75 ml/στρ. **Ανθοκομικά:** εφαρμόστε διαφυλλικά με δόση 150 - 200 cc/ 100Lit ή διαμέσω ριζοποτίσματος με δόση 100 - 300 ml/στρ. **Εκτακτικές Καλλιέργειες:** διαφυλλική εφαρμογή με δόση 100 - 200ml/στρ. με επαρκή όγκο ψεκαστικού υγρού.

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777.



ΔΙΑΝΟΜΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Εμ. Μπενάκη 8, 145-61 Κηφισιά Τηλ.: 210 80 12 367
Fax: 210 62 33 196 info@anthesis.gr www.anthesis.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1λίτρο 5λίτρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Even agro Pol. Ind. Romica, Calle 3, Parcela 132 D
02007 Albacete / Apartado 5332, España/Spain

Αριθμ. Παρτίδας:
Ημ/νία Λήξης: