

## RAPAX AS

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια καταπόσεως του *Bacillus thuringiensis*. Οι παραγόμενες πρωτεΐνες (τοξίνες) του βακτηλίου με κρυσταλλική μορφή, καταστρέφουν τα επιθηλιακά κύτταρα στο μεσέντερο των εντόμων με αποτέλεσμα την καταστροφή του εντερικού σωλήνα και τον θάνατο των προνυμφών σε διάστημα λίγων ημερών.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με συμβατικούς ψεκαστήρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας τα συστατικά του ψεκαστικού με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Το ψεκαστικό μίγμα να χρησιμοποιείται μέσα σε 12 ώρες μετά από την παρασκευή του.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαρτηθούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει πρέπει να αραιώνεται με νερό και να ψεκάζεται στην περιοχή που έχει ήδη γίνει εφαρμογή. Οι κενές φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό ξεπλύνσιμο ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό), και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, και αναποτίθενται όλα σε σημεία συλλήψεως, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνδυάζεται με αθροιστικά προϊόντα όπως Βορβογιάτες ποττών, πολυβιολογικά σασθέτια κλπ. Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Περιέχει *Bacillus thuringiensis* subspecies *kurstaki* strain EG 2348. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη / φώτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Οι εργαζόμενοι να φορούν ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να απορριβείτε ή ρίψετε μέσα των συστημάτων αποχέυσης από τις λιβάδρες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αποκοινηθείτε τις οδηγίες χρήσης.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα όμματα με νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμένει.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε άμεσα με νερό και σαπούνι την περιοχή που έχει έρθει σε επαφή με το προϊόν.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  
(210) 7793777

# RAPAX® AS

## Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis* subsp.

*kurstaki* strain EG 2348, 22,56 % β/ο ή 24.000 IU T.ni/mg

Βοηθητικές ουσίες: 81,2 % (β/β)

ΑΑΔΑ: 14753 /31.08.2020

Εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008



CBSC (Europe) S.r.l.  
Via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG), Ιταλία  
Tel: 0039-035-335313 Fax: 0039-035-335334  
e-mail: info@biogard.it@cbceurope.it



Anthesis IKE  
Εμ. Μπενάκη 8 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ  
Τ: 210-8012 367 Φ: 210-6233 196  
E: info@anthesis.gr www.anthesis.gr

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 500ml

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πέλοιο ακουήκη (Helicoverpa armigera). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και φυλλώματος (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΕΠΙΠΕΡΑΛΙΩΣΗ: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Πράσινα Πεπόνια (Άμυ), Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ: Ανθοτρίτης (*Prays citri*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΜΗΑΘΕΙΔΗ: Μηλιά, Ακλιδοιά, Κουδωνιά: Φυλλόδοτες: (*Pandemis cerasana*, *Archips podana*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερσινιά, Κορινθιά (*Glycia molesta*), Ανάσσα (*Anarsia lineatella*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΑΜΠΕΛΗ (ονομαστική και επιτραπέζια σταφύλη) Ευκείδη (*Loebesia botrana*) Εφίστα (*Ephesia spp.*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 75-100 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 10 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΕΛΙΑ Πυρροτρίτης (*Prays oleae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Προνύμφες λεπιδοπτέρων (*Argyrotaenia pulchellana*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ-Θ): Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Σπινόκαρδα (*Syntrichia litoralis*). Φυλλοβόκρινος τομάτας (*Tuta absoluta*), Πράσινο ακουήκη (*Helicoverpa armigera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΑΓΚΙΝΑΡΑ Κόμμο ορνιθόφωτος (*Gortyna xanthodes*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση του φυλλώματος (BBSCH-15) με μεσοδοσίσταμα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 100 λίτρα / στρέμμα.  
• ΦΑΣΙΟΝΑ (Υ-Θ) (ερόσινα και έρπη) Πράσινο ακουήκη (*Helicoverpa armigera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των νεαρών προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 100 λίτρα / στρέμμα.  
• ΒΑΜΒΑΚΙ Πράσινο ακουήκη (*Helicoverpa armigera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των νεαρών προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΚΑΠΝΟΣ Πράσινο ακουήκη (*Helicoverpa armigera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των προνυμφών και σπόρων (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα / στρέμμα.  
• ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ Ουλήθορες προνύμφες: Πιτυοκόμη (*Thaumetoea pityocampa*, *Thaumetoea processionea*). Ψευδοκί φυλλώματος (BBSCH-80) με μεσοδοσίσταμα 7- 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 200 λίτρα / στρέμμα.

**Παρατηρήσεις:**  
1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρήσετε οι πρώτες θύμες και αναπαύστετε κατά διαστήματα ώστε να πληθύνουν να κρασιέει κομψός. Κρασιέει κατά διαστήματα ή μετά από τις φυλλώτες επιφανείες για οι προνύμφες πρέπει να καταποθεί το σκεύασμα. Μετά τον πάσχηση οι κάμψεις σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.  
2. Μην ψεκάτε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αμέσως πρέπει να ψεκαθεί ξανά.  
3. Το έρπη των δέντρων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβόλης.  
4. Ο ψεκασμός να διενεργηθεί τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

**ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:**  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Πράσινα Πεπόνια, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ), ΜΗΑΘΕΙΔΗ (Μηλιά, Ακλιδοιά, Κουδωνιά) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερσινιά), ΑΜΠΕΛΙΑ (ονομαστική και επιτραπέζια σταφύλη), ΕΛΙΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ-Θ) (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα), ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΦΑΣΙΟΝΑ (Υ-Θ) (ερόσινα και έρπη), ΒΑΜΒΑΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ, ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ: 3

**ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΒΕΣΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Όλες οι καλλιέργειες: Δεν ορίζεται  
ΕΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΗ ΟΪΘΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΑΘΙΕΣΤΕΙ ΔΙΑΚΡΙΘΗΤΑ ΑΝΕΠΙΘΑΝΟΤΑ. Το σκεύασμα περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain (EG 2348), που ανήκει στην ομάδα 11 κατά IRAC.  
Να μη χρησιμοποιείται νερό για ψεκασμό με pH άνω του 8, αλλιώς να χρησιμοποιείται παρόχθονα οξίνισμα.

**ΕΤΟΙΧΙΑ ΦΥΤΟΟΙΚΟΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:** Δεν είναι ψεκαστικό στα καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΒΗΚΩΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Διατηρείται το προϊόν σε δροσερό, έρπη και κατά αρχίζουσα χώρα. Σε Βρεταννοκράτο διατηρείται (20 °C) το προϊόν παρασκευασμένο 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής του. Κλείστε ξανά το σκεύασμα εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί όλο το περιεχόμενο.

Αρ. Πρωτοκόπ. - Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί συσκευασίας

