

MADEX® TOP

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Cydia pomonella granulovirus isolate V15

(CrGV-V15): 3X10¹³ OB/L

Βοηθητικές ουσίες: 55.2% β/β

ΑΑΔΑ: 14.474/13-3-2014

Μικροβιακό εντομοκτόνο (*Cydia pomonella granulovirus*) για την καταπολέμηση των προνυμφών της καρπόκαψας. Δρα μέσω της κατάποσης. Οι μολυσμένες προνύμφες πεθαίνουν μετά από μερικές ημέρες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος διάθεσης στην Αγορά:

Anthesis IKE

Εμ. Μπενάκη 8, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλ.: 210-8012 367, Fax: 210-6233 196

E-mail: info@anthesis.gr

Το εμπορικό σήμα **MADEX®TOP** ανήκει στην

Andermatt Group AG

**Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**



Blooming together

Μέλος του ομίλου Andermatt

**Περιέχει *Cydia pomonella granulovirus*.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση**

Ανοίξτε εδώ ▶

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ - Φυλάξτε το κλειδωμένο

μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε τα ψεκαστικά σταγονίδια. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

«Συνιστάται να φοράτε γάντια και μάσκα μιας χρήσεως για αεροζόλ (EN149 FFP3 ή άλλη ανάλογη) κατά τη διάρκεια της εφαρμογής»

"Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών πρέπει να τηρείτε αφέκαστη ζώνη 5m από τα επιφανειακά νερά.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Αφαιρέστε αμέσως τυχόν μολυσμένα ή βρεγμένα ρούχα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 100ml

Ημ. Παρασκευής, Αρ. Παρτίδας, Βλ. επί συσκευασίας

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα NASHI), ΚΑΡΥΔΙΑ: Για την **Καρπόκαψα της Μηλίας** (*Cydia pomonella*): Έναρξη ψεκασμών πριν την εκκόλαψη των πρώτων προνυμφών. Επανάληψη κάθε 8-14 ημέρες (ανάλογα με την ηλιοφάνεια)1.

Δόση: 10 κ.εκ / στρέμμα (max) (8-25 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού) **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-120 λίτρα / στρέμμα. **Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. περίοδο:** 10 (γενικά 3 εφαρμογές ανά γενιά).

Παρατηρήσεις:

1) Επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ηλιόλουστες μέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε μία ηλιόλουστη). Οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης (με ψεκαστήρα συρόμενο από τρακτέρ, μηχανοκίνητο ή επινώτιο).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε

καλά το προϊόν πριν τη χρήση.

Προσθέστε την ποσότητα σκευάσματος που αναλογεί στην επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε και αναδεύσατε. Για να επιτευχθεί η καλύτερη αποτελεσματικότητα το pH του ψεκαστικού υγρού πρέπει να κυμαίνεται από 5-8.5.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε το πάλι με καθαρό νερό. Μην ξεπλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του

φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να μην συνδυάζεται το προϊόν με οποιαδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί μειώσει ή να αυξήσει το pH του ψεκαστικού υγρού κάτω από 5 ή πάνω από 8.5. Να μην συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Το προϊόν είναι ευαίσθητο στην υπεριώδη ακτινοβολία γι' αυτό είναι προτιμότερο οι ψεκασμοί να εφαρμόζονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
- Χρησιμοποιείται νερό με pH 5-8. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν προσθέστε κατάλληλο buffer.
- Κατά τον ψεκασμό τα φυτά δεν πρέπει να είναι υγρά από βροχή ή σταγόνες δροσιάς.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Όλες οι καλλιέργειες: 1 Ημέρα

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό χώρο αποφεύγοντας θερμοκρασίες πάνω από 5 °C.

Διατηρείται για 2 χρόνια σε θερμοκρασία μικρότερη των 5°C. Σε θερμοκρασία μικρότερη των -18°C διατηρείται για απεριόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να υποβαθμιστεί.