

MADEX® TWIN

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: 3×10^{13} granules CpGV/L (44.8% β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 55.2% β/β

ΑΔΔΑ: 14751/14.07.2020

Μικροβιακό εντομοκτόνο (*Cydia pomonella granulovirus*) για την καταπολέμηση των προνυμφών της καρπόκαψας. Δρα μέσω της κατάποσης. Οι μολυσμένες προνύμφες πεθαίνουν μετά από μερικές περιόδους.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος διάθεσης στην Αγορά:

Anthesis IKE

Εμ. Μπενάκη 8, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

Tηλ.: 210-8012 367, Fax: 210-6233 196

E-mail: info@anthesis.gr

Το εμπορικό σήμα MADEX®TWIN ανήκει στην
Andermatt Group AG

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Περιέχει *Cydia pomonella granulovirus*.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ανοίξτε εδώ ►

ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ - Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

Εάν ζητάστε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την επικέτα.

Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, σταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε γάντια, μάσκα και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

"Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: (αυτό είναι δυνατό μόνο με έκθεση σε ζεστό προϊόν), Μετακινήστε το παθόντα στον δροσερό αέρα, τοποθετήστε τον σε πρι-όρθια θέση και καλαρώστε τα ρούχα. Σε περίπτωση δύσπνοιας, παρέχετε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλυσθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό Ανασηκώστε τα βλέφαρα για να εξασφαλίσετε ενδελεκή πλύση. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητάστε ιατρική συμβουλή. Δεν είναι γνωστά συμπτώματα ή τυπικές επιδράσεις.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Διληπτηρίασεων: 2107793777

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 100ml

Ημ. Παρασκευής, Αρ. Παρτίδας, Βλ. επί συσκευασίας

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ -
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:**

Μπλοειδή (Μπλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμπλα NASHI, Μουσμουλιά): Για την Καρπόκαψα της Μπλιάς (*Cydia pomonella*): Έναρξη ψεκασμών πριν την εκκόλαψη των πρώτων προνυμφών με μεσοδιάστημα 6-8 πλιόλουστες μέρες (2 μερικώς πλιόλουστες πιμέρες αντιστοιχούν σε 1 πλιόλουστη). **Δόση:** 10 κ.εκ / στρέμμα (12.5 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού) Όγκος ψεκ. υγρού: 80 λίτρα / στρέμμα. **Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 9**

Για την Καρπόκαψα της Ροδακινιάς (*Grapholita molesta*): Έναρξη ψεκασμών πριν την εκκόλαψη των πρώτων προνυμφών με μεσοδιάστημα 6-8 πλιόλουστες μέρες (2 μερικώς πλιόλουστες πιμέρες αντιστοιχούν σε 1 πλιόλουστη). **Δόση:** 10 κ.εκ / στρέμμα (12.5 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 80 λίτρα / στρέμμα. **Μεγ. αριθμός εφαρμ.**

ανα καλ. περίοδο:12

Πυρπνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά) & Αμυγδαλιά: Για την Καρπόκαψα της Ροδακινιάς (*Grapholita molesta*): Έναρξη ψεκασμών πριν την εκκόλαψη των πρώτων προνυμφών με μεσοδιάστημα 6-8 πλιόλουστες μέρες (2 μερικώς πλιόλουστες πιμέρες αντιστοιχούν σε 1 πλιόλουστη).

Δόση: 10 κ.εκ / στρέμμα (12.5 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 80 λίτρα / στρέμμα. **Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 12**

Καρυδιά: Για την Καρπόκαψα της Μπλιάς (*Cydia pomonella*):

Έναρξη ψεκασμών πριν την εκκόλαψη των πρώτων προνυμφών με μεσοδιάστημα 6-8 πλιόλουστες μέρες (2 μερικώς πλιόλουστες πιμέρες αντιστοιχούν σε 1 πλιόλουστη). **Δόση:** 10 κ.εκ / στρέμμα (12.5 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού).

Όγκος ψεκ. υγρού: 80 λίτρα / στρέμμα. **Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 9**



Παρατηρήσεις:

- Η 1η εφαρμογή να γίνεται 85 πμεριθαμούς μετά το πρώτο ζεστό βράδυ με δραστηριότητα πτήσης. Το κατώτερο θερμικό όριο για την ανάπτυξη της καρπόκαψας είναι οι 10°C.
- Προτείνονται 3 εφαρμογές ανά γενιά.
- Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο στα μπλοειδή είναι 12.

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν τη χρήση. Προσθέστε την ποσότητα σκευάσματος που αναλογεί στην επιφάνεια που

θέλετε να ψεκάσετε και αναδεύσατε.

Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μπχανημάτων:

Μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε πάλι με καθαρό νερό. Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Συνδυαστικότητα:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για να επιτευχθεί η καλύτερη αποτελεσματικότητα το pH του ψεκαστικού υγρού πρέπει να κυμαίνεται από 5-8.5. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν προσθέστε κατάλληλο διορθωτή pH. Κατά τον ψεκασμό τα φυτά δεν πρέπει να είναι υγρά από βροχή ή σταγόνες δροσιάς. Κατά τον ψεκασμό εξασφαλίστε ομοιόμορφη κάλυψη ολόκληρου του φυτού. Επιτρέπεται η χρήση του Madex Twin κατά την άνθηση και κατά τις περιόδους παραγωγής μελιτωμάτων όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικών πληθυσμών, προτείνεται εναλλαγή του Madex Twin με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικούς τρόπους δράσης ή με στελέχη του ιού CpGV αποτελεσματικά στα ανθεκτικά στελέχη. Ως μέτρο προφύλαξης, προτείνεται η αποφυγή της χρήσης του προϊόντος για την καταπολέμηση δύο διαδοχικών γενεών του εντόμου οπότε μειώνεται αντίστοιχα ο μέγιστος αριθμός ψεκασμών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Όλες οι καλλιέργειες: **1 Ημέρα**

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, σκοτεινό και δροσερό χώρο σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Διατηρείται για 2 χρόνια σε θερμοκρασία μικρότερη των 5°C.