FOLIAREL QS

GR

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Βορικό νάτριο

Σύνθεση (%w/w): Ολικό Βόριο (B), Υδατοδιαλυτό 21,0

«Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.
Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.»

Μορφή: Μικροκοκκώδες

Χαρακτηριστικά

Το FOLIAREL® QS είναι ένα μικρο-κοκκώδες λίπασμα Βορίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο διαφυλλικά όσο και από εδάφους. Χρησιμοποιείται για την πρόληψη και διόρθωση τροφοπενιών Βορίου. Λόγω της υψηλής διαλυτότητας, αναμιγνύεται πολύ εύκολα με άλλα λιπάσματα και ΦΠ στο διάλυμα. Το Βόριο είναι βασικό ιχνοστοιχείο που: χρησιμοποιείται για τη σύνθεση και μεταφορά των υδατανθράκων, βελτιώνει τη γονιμότητα, αυξάνει την κυτταροδιαίρεση και συμβάλλει στη δημιουργία του κυτταρικού τοιχώματος. Επίσης συμβάλλει στη σύνθεση των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Οι ελλείψεις Βορίου είναι συχνές σε αμμώδη και αργιλώδη εδάφη με pH κάτω από 5.5 ή πάνω από 7.5. Τροφοπενίες παρατηρούνται επίσης σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Οργανική Ουσία καθώς και σε συνθήκες στρες λόγω ξηρασίας ή υπερβολικής υγρασίας.

Καλλιέργειες	Εφαρμογή στο έδαφος		Εφαρμογή διαφυλλικά		
	Δόση γρ./στρ.	Χρόνος εφαρμογής	Δόση γρ./στρ.	Μέγιστη Συγκ %	Χρόνος εφαρμογής
Ζαχαρότευτλα	500	Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	200-500	2	Στο στάδιο των 8 και 16 φύλλων
Ηλίανθος	500	Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	200-300	1	Στο στάδιο των 4-8 φύλλων 1-2 εφαρμογές
Βαμβάκι	500	Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων και υγρών λιπασμάτων	200-300	0,7	3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες από το στάδιο των 8 φύλλων
Ελιά	500-800	Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων επί της γραμμής καλλιέργειας	200-300	0,2	Πριν από την άνθιση και κατά την καρπόδεση
Πατάτα	500	Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	200-300	0,7	2 εφαρμογές πριν την άνθιση
Φασόλια και άλλα ψυχανθή για καρπό	200-400	Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	100-150	0,3	Από φυτά 10-15 εκ. ύψος 1-2 εφαρμογές έως την άνθιση
Μηδική και άλλα ψυχανθή για ζωοτροφή	500-800	Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	100-200	1	Μετά από κάθε κοπή
Αμπέλι & Δενδροκομικές καλλιέργειες	500-700	Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων επί της γραμμής καλλιέργειας	100-200	0,1	Πριν την ανθοφορία και στην καρπόδεση
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	400 600	Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	50-150	0,25	Πριν την ανθοφορία και στην καρπόδεση
Ανθοκομικά	100 200	Στα πρώτα στάδια	50	0,1	2 εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες. Στα πρώτα στάδια
Υδρολίπανση	200 500				

Συνδυαστικότητα:
Το FoliarelQS είναι συμβατό με τα περισσότερα Φυτοπροστατευτικά και υγρά λιπάσματα (εκτός από αυτά που περιέχουν αμμωνιακά) όταν το pH είναι μεταξύ 5 και 8. Να μη χρησιμοποιείται με υπερβολικά όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Σε κάθε περίπτωση, το διάλυμα με Foliarel QS πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την Παρασκευή του - αποφυγή υδρόλυσης. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τη δυνατότητα ανάμειξης, να γίνεται πάντα δοκιμή σε μικρή έκταση πριν τη χρήση. Να μην εφαρμόζεται με υψηλές θερμοκρασίες, σε πλήρη ηλιοφάνεια και στην ανθοφορία.

Οδηγίες προετοιμασίας ψεκαστικού διαλύματος:
Γεμίστε τη δεξαμενή στο μισό με νερό και μετά προσθέστε τα ΦΠ ή τα λιπάσματα με συνεχή ανάδευση. Προσθέστε επιπλέον ¼ νερό και με αργό ρυθμό προσθέστε το Foliarel QS συνεχίζοντας την ανάδευση. Γεμίστε τη δεξαμενή εντελώς με νερό και συνεχίστε 5 λεπτά ακόμα την ανάδευση πριν την εφαρμογή.
Η ευθύνη του παρασκευαστή περιορίζεται στην προμήθεια του προϊόντος στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, τη χρήση του σύμφωνα με τη δόση και τις συνιστώμενες οδηγίες. Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την αποθήκευση, το χειρισμό, τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

Κίνδυνος.



Καθ. Βάρος:
1 kg e

Οκταβορικό δινάτριο, τετραένυδρο (CAS:12280 03-4). Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Μακριά από παιδιά.
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Αριθμ. Παρτίδας: Ημ/νία Παρασκευής:

Παραγωγός/προμηθευτής: SCL Italia SpA
Headquarter: Via F. Filzi 25/A, 20124 Milano, ITALY
Tel. +39-02-677168.1
Fax +39-02-677168.20
E: scarpelli@larderellogroup.com
www.larderellogroup.com

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ANTHESIS I.K.E.
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ: (+30) 2108012367
Fax: (+30) 210 62 331 96
E: Info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

anthesis
Blooming together
Μέλος του ομίλου Andermatt