

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το Super Fifty® είναι ένα υδατοδιαλυτό συμπυκνωμένο υγρό που περιέχει εκχυλίσματα φυκίων του είδους *Ascophyllum nodosum*, σχεδιασμένο για διαφυλλική ή από εδάφους εφαρμογή. **ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Καλλιέργεια	ml/στρ	Δόση και χρόνος διαφυλλικής εφαρμογής			
		Πρώτη	Δεύτερη	Τρίτη	Τέταρτη
Πατάτα, Γλυκοπατάτα	200	50% εμφάνιση φυλλωρίων	Έναρξη κορυφαίας ανάπτυξης	Ολοκλήρωση Κορυφαίας ανάπτυξης	Στην έναρξη της άνθησης
Λάχανο, Μπρόκολο, Λάχανο Κάλε, Κουνουπίδι	200	3 ^ο πραγματικό φύλλο	6 ^ο -8 ^ο πραγματικό φύλλο	10-14 μέρες αργότερα	Στην έναρξη σχηματισμού κεφαλής
Κρεμμύδι, Σκόρδο, Κοκκάρι, Πράσο	200	50% εμφάνιση φυλλωρίων	6 ^ο -3 ^ο πραγματικό φύλλο	Έναρξη βολβοποίησης	Φούσκωμα Βολβού
Αγγούρι, Κολοκύθα (επιτορική και μη), Πεπόνι	200	3 ^ο - 5 ^ο φύλλο	7-10 μέρες αργότερα	Πριν την άνθηση	Ανάπτυξη του καρπού
Φασόλι, Φακή, Αρακάς, Σόγια	200	3 ^ο πραγματικό φύλλο	9 η εβδομάδα ανάπτυξης	Πριν την άνθηση	Έναρξη σχηματισμού του καρπού
Καρότι, Παντζάρι, Τζίντζερ, Ραπανόλα, Γογγύλι	200	3 ^ο πραγματικό φύλλο	2 εβδομάδες αργότερα	Στάδιο ανάπτυξης της ρίζας	14 μέρες αργότερα
Μαρούλι, Σέλερι, Σπανάκι, Μοσχοκάρυδο, Ραντίτσο (Ιταλικό λάχανο)	200	Φυτά 14 ημερών	7 μέρες αργότερα		Φυτά 35 ημερών
Τομάτο, Πεπερό, Μελιτζάνα Μπράμα	200	Φυλλάρια 21-28 ημερών	7-10 μέρες αργότερα		Στάδιο έναρξης σχηματισμού του καρπού
Ρύζι, Σόργο, Βρώμη, Κριθάρι	200	4 ^ο φύλλο	Σχηματισμός πρώτου κόμμου		Σχηματισμός κορυφαίου φύλλου
Μπιτάκι, Τριφύλλι για βόσκηση η/και για ενσίωση	200	6-10 cm ύψος φυτού	5-7 μέρες μετά το πρώτο κόψιμο		5-7 μέρες μετά το δεύτερο κόψιμο
Ήλιανθος	200	10 μέρες μετά τη φύτευση	30 μέρες αργότερα		Μετά το σχηματισμό ανθών οφθαλμών
Χειμωνιάτικα, Καλοκαιρινά Σιτηρά	200	5 ^ο φύλλο	Σχηματισμός πρώτου κόμμου (200ml/στρ)		Σχηματισμός κορυφαίου φύλλου (200ml/στρ)
Καλαμίντα, Γλυκό καλαμίντι	200	4 ^ο -5 ^ο φύλλο	8 ^ο φύλλο		Πριν ανοίξει η φόβη
Ελαιοκάρβυβη	200	4 ^ο φύλλο			Στάδιο ανοίγματος πρώτου λυαλοειδίου
Φυτά Θερμοκηπίου & Κρυσταλλικά	200				Κάθε 14 μέρες ή κάθε νέο κόψιμο ή κάθε νέα έναρξη καρποφορίας
Εναρξη του νέου φυτίνου	200				Έναρξη εφαρμογής σε πρώιμο στάδιο της ριζικής ανάπτυξης και συνεχώς σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα
Φρούτα & Ξηροί καρποί		Πρώτη	Δεύτερη	Τρίτη	Τέταρτη
Μελούρι, Σαφίρι, Φραγκοστάφυλο	200	Πριν την άνθηση	Πρώτο πετάλι	Κάθε 7 μέρες για όσο καιρο μεγαλώνει η ράγα	Με την έναρξη αλλαγής χρώματος
Αχλάδι	200	Με την εμφάνιση ανθικών καταβολών	Πριν την άνθηση	1 εβδομάδα μετά την πτώση των πετάλων	Όταν το φρούτο έχει μέγεθος 1.2 - 1.5 cm
Μήλο	200	Πριν τη ρόδιση κορυφή	Στην πρώτη κορυφή άνθησης	Όταν το φρούτο έχει μέγεθος 10-12 mm	2-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή
Ροδάκινο, Νεκταρίνι, Βερίκοκο, Διαμάντινο	200	Στη ρόδιση ή λευκή κορυφή	Πρώτο πετάλι	Πρώτο κάλυκα	Μεγέθυνση του φρούτου, όταν το φρούτο έχει μέγεθος 6-10 mm
Επιτραπέζιο σταφύλι	200	Επιτύχη βλαστού 20cm	Πριν την άνθηση	Μετά την άνθηση	Δύο εφαρμογές στο κλείσιμο του τασιμού και στον περασμό
Σταφύλι (Ουγενόλιας, Σαφίρι, για Χυμοποίηση)	200	Πριν την άνθηση	Μετά την άνθηση	Μετά την πτώση της καλύκτρας	Στον περασμό (Στάδιο αλλαγής χρώματος)
Ακτινίδιο & Επερσοειδή (Λεμόνι, Μανταρίνι, Πορτοκάλι)	200	Έναρξη εαρινής ανάπτυξης	2 εβδομάδες πριν την άνθηση	Πρώτο πετάλι	10 μέρες μετά
Αμύγδαλο	200	Εμφάνιση ανθών	Πρώτο πετάλι	Μετά την πτώση του κάλυκα	Αρχικά στάδιο μεγέθυνσης του καρπού
Αβραμότι	200	Ανοίγματα ανάπτυξης	Πριν την άνθηση	Πρώτο πετάλι	2 εφαρμογές, κάθε 10 μέρες (καλοκαιρινή περίοδος)
Ελιά και Ξύλο	200	Κατά τη διάρκεια της νέας βλάστησης	2 εβδομάδες πριν την άνθηση	Μετά την πτώση πετάλων	Νωρίς κατά τη μεγέθυνση του καρπού
Καρότι, Φουντούκια, Πικάν, Κάστανο	200	Έναρξη της άνθησης	7.5% του βάρους του καρπού μέσα στον φλοιό	14 μέρες μετά (στάδιο μεγέθυνσης του καρπού)	28 μέρες μετά τη 2 ^η εφαρμογή
Κεράσια	200	Πρώτο πετάλι	Πρώτο κάλυκα		7 μέρες μετά
Φράουλα, Ράμπι, Κράμπι	200	Πριν την άνθηση	Πλήρης άνθηση		3 εφαρμογές κάθε 10 μέρες (μέση καλοκαιριά ή έως πρώτη συγκομιδή)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η καλύτερη αναλογία διάλυσης είναι 2lt στα 500lt νερό για 1Ha.
Ανάμιξη: Ανακινείτε το προϊόν καλά πριν το ανοίξετε. Γεμίστε το βυτίο ψεκασμού με το μισό νερό από όσο θα χρειαστείτε για τον ψεκασμό. Προσθέστε την ποσότητα του προϊόντος που χρειάζεστε και ανακατέψτε καλά καθώς προσθέτετε το υπόλοιπο μισό νερό. Το διάλυμα του Super Fifty® πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Σε περίπτωση ψεκασμού βεβαιωθείτε ότι θα γίνει σωστό λούσιμο του φυτού για μέγιστα αποτελέσματα. **Συνήθεις Εφαρμογές:** Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε ζροσερές συνθήκες για καλύτερα αποτελέσματα. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Χρήση προσκαλλητικού δεν είναι απαραίτητη. **ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ:** Το Super Fifty® είναι συμβατό με τα περισσότερα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και λιπάσματα. Μπορείτε να καθαρίσετε την συμβατότητα με τη χρήση ενός μικρού τεστ (πχ σε έναν κουβά) κάντε την ανάμιξη ίδιας αναλογίας πριν την κάνετε στο βυτίο. Προσθήκη του Super Fifty® σε χημικά με υψηλή οξύτητα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να προκληθεί ζημία. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ:** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε στην διάρκεια του ψεκασμού. Αποφύγετε με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος μετά την εφαρμογή και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, βγάλτε τους φακούς επαφής, εάν φοράτε και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Σε περιπτώσεις επαφής με το δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό. Και στις δύο περιπτώσεις, εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε συμβουλή γιατρού. Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. **ΑΠΟΦΥΓΗΣΗ:** Αποθηκεύστε πάνω από τους 5^ο C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατείστε το μακριά από παιδιά. **Εγγύηση πωλητή:** η εγγύηση του πωλητή είναι περιορισμένη σε όρους που καθορίζονται στην ετικέτα. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη του κινδύνου σε πρόσωπα και σε ιδιοκτησία που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή το χειρισμό του προϊόντος και αποδέχεται το προϊόν με αυτή την προϋπόθεση.

Σύνθεση:
 Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου (Κ₂O) 8% Εκχύλισμα του *Ascophyllum nodosum*... 50% β/ο (500g ξηρού βάρους ανά λίτρο).

Καθαρό περιεχόμενο: 1L
Καθαρό βάρος: 1.23kg
Ειδική βαρύτερη: 1.23

anthesis
 Blooming together

ANTHESIS IKE
 Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά
 T 210 8012367 E info@anthesis.gr
 www.anthesis.gr

Αρ. Παρτίδας, Ημ. Λήξης: Βλ. επί συσκευασίας



SuperFifty® 0-0-8

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
 Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την υπ' αρ. 217217/2004 (Β' 35) υπουργική απόφαση.

Ενα εξαιρετικά συμπυκνωμένο εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum*
Αποδεδειγμένη βελτίωση της Ικανότητας Ανταλλαγής Κατιόντων και μείωση του αβιοτικού στρες των καλλιεργειών

Βελτιώνει την:

- Παραγωγή
- Εμπορική αξία
- Ανάπτυξη του ριζικού συστήματος



Παράγεται από: BioAtlantis Ltd.,
 Clash Industrial Estate, Tralee,
 Co. Kerry, Ireland
 T: +353 (0) 66 711 8477
 www.bioatlantis.com

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Προϊόν της Ιρλανδίας