

ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ

ISOMATE A/OFM

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ
(*Grapholita molesta*) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑΣ
(*Anarsia lineatella*) ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ.

ISONET LR

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ
(*Adoxophyes orana*) ΣΕ ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι διαχυτήρες περιέχουν συνθετική φερομόνη, η οποία από χημικής άποψης είναι παρόμοια με τη φυσική φερομόνη που παράγουν τα λεπιδόπτερα: Καρπόκαψα (*Grapholita molesta*), Ανάρσια (*Anarsia lineatella*) και του Φυλλοδέτη (*Adoxophyes orana*). Βασίζεται στην καινοτόμο Μέθοδο Παρεμπόδισης Σύζευξης (Mating Disruption) ή Γενετήσια σύγχυση, σύμφωνα με την οποία επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας των πληθυσμών και κατ'έκταση:

- τη μείωση του πληθυσμού
- την ελαχιστοποίηση της ζημιάς στους καρπούς



Anarsia lineatella



Cydia molesta

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η τοποθέτηση των διαχυτήρων των προϊόντων Isomate® A/OFM και Isonet LR πρέπει να γίνει νωρίς την άνοιξη, ΠΡΙΝ να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει.

ΔΟΣΗ

Δόση: Isomate® A/OFM 80-100 διαχυτήρες / στρ.

Δόση: Isonet LR 20-30 διαχυτήρες / στρ.



ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ



ISOMATE A/OFM ISONET LR

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η επιτυχία της μεθόδου βασίζεται στη συχνή παρακολούθηση των πληθυσμών των λεπιδοπτερών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε εάν απαιτηθεί να μπορούμε άμεσα να επέμβουμε με εγκεκριμένα χημικά προκειμένου να μειώσουμε τους πληθυσμούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλους τους οπωρώνες φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (και ειδικά στα όρια των αγρών) και να γίνεται τακτική μέτρηση και εκτίμηση των πληθυσμών, καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Ένδειξη της επιτυχούς εφαρμογής της μεθόδου είναι οι μηδενικές ή οι ελάχιστες συλλήψεις ακμαίων λεπιδοπτερών στις παγίδες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISOMATE® A/OFM & ISONET LR

1. Ελαχιστοποίηση χημικών υπολειμμάτων
2. Δεν απαιτείται χρονικό διάστημα πριν τη συγκομιδή
3. Φιλικό προς τον χρήστη (εφαρμοστή), τον καταναλωτή και το περιβάλλον (Low risk)
4. Συμβατό με την ωφέλιμη πανίδα
5. Ιδανικό εργαλείο σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM)
6. Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από το έντομο εχθρό
7. Διάρκεια δράσης τουλάχιστον 150 ημέρες
8. Μία μόνο εφαρμογή κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου

ΠΡΟΣΟΧΗ



Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.



Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

«Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.»

ISOMATE A/OFM: Αρ. Άδ. Διάθ. Αγορά: 9065/22-10-2012

ISONET LR: Αρ. Άδ. Διάθ. Αγορά: 9081/05-12-2017

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ANTHESIS IKE

Κάτοχος Έγκρισης:

CBC (EUROPE) Srl: Via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG) Ιταλία

Tel: +39-035-335313 Fax: +39-035-335334

Παρασκευαστής του σκευάσματος: Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία