

CURATIO 38 DC

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ (DC)



**Μυκητοκτόνο επαφής
με προληπτική και θεραπευτική
δράση ενάντια στο Φουζικλάδιο
των Μηλοειδών, της Μονίλιας
των Πυρηνοκάρπων και του
Οιδίου του Αμπελιού**

Πολυθειούχο ασβέστιο 38 % (β/ο)

**Μορφή: Εναιωρηματοποίησιμο
συμπύκνωμα (DC)**

ΑΑΔΑ: 60959/07.05.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικότερα σε χρονιές με συνεχείς βροχοπτώσεις και παρατεταμένη περίοδο όπου τα φύλλα παραμένουν υγρά, οι μυκητολογικές ασθένειες όπως το Φουζικλάδιο της Μηλιάς (*Venturia inaequalis*) μπορούν να αναπτυχθούν σε σημείο που να απειλούν την οικονομική βιωσιμότητα κάποιων καλλιεργειών. Τα μυκητοκτόνα επαφής χάνουν την αποτελεσματικότητά τους καθώς εκπλένονται από την βροχή και καθιστούν την χρήση των θεραπευτικών μυκητοκτόνων απαραίτητη. Το **Curatio 38 DC** με τον μοναδικό τρόπο δράσης του παρέχει θεραπευτική και προστατευτική δράση με μακρά διάρκεια ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Λόγω αλκαλικής αντίδρασης, το πολυθειούχο ασβέστιο προκαλεί σαπωνοποίηση των λιπαρών οξέων του κυτταρικού τοιχώματος του μύκητα, επιτυγχάνοντας καλύτερη διείσδυση της δραστικής ουσίας η οποία παρεμποδίζει το μεταβολισμό του μύκητα. Επίσης, αφού στεγνώσει πάνω στη φυλλική επιφάνεια, δημιουργείται ένα λεπτό στρώμα θειαφιού, που έχει προστατευτική δράση.

CURATIO 38 DC

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ (DC)

Το CURATIO® 38 DC, με την καινοτόμο σύνθεσή του, προσφέρει λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων, ειδικότερα στις προανθικές εφαρμογές, ελέγχοντας τις διαχειμάζουσες μορφές των οργανισμών στόχων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αρ. εφαρμογών ανα καλλιεργ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		λίτρα / στρ. (max)	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρ.		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά Αχλαδιά	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> <i>V. pirina</i>	2,25	50-150	Μία εφαρμογή πριν το στάδιο ρόδινης/λευκής κορυφής (πριν BBCH57)	1
		1,8		Μία εφαρμογή στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής (BBCH 57)	1
		1,2		Επόμενες Εφαρμογές (έως 9 ανα 5 ημέρες, αν χρειαστεί)	9 / 5
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά Ροδακινιά Δαμασκηνιά Κερασιά	Φαιά σήψη <i>Monilia laxa</i>	2,4	100	Μία εφαρμογή στο στάδιο της Ρόδινης κορυφής (BBCH 57)	1
		1,6		Επόμενες Εφαρμογές (έως 3 ανα 5 ημέρες, αν χρειαστεί)	3 / 5
ΑΜΠΕΛΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια	Οίδιο <i>Uncinula necator</i>	2	100	Μία εφαρμογή πριν την άνθηση (πριν BBCH 60)	1
		1		Μία εφαρμογή στην αρχή της άνθησης (BBCH 60-63)	1
		1		Επόμενες εφαρμογές (έως 3 ανά 5 ημέρες)	3 / 5

- Αποτελεσματική προστασία κατά του Φουζικλάδιου, της Μονίλιας και του Οιδίου στις εγκεκριμένες καλλιέργειες
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα στην έκπλυση από βροχοπτώσεις

- Δεν αφήνει υπολείμματα
- Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από τα παθογόνα
- Χρησιμοποιείται στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ) 834/2007 και 889/2008



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά



Κάτοχος της άδειας: Biofa AG
Rudolf-Diesel Str. 2, 72525 Münsingen, Γερμανία