



## Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση της μονιλίας και της τεφράς σήψης σε διάφορες καλλιέργειες

Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με βάση επιλεγμένα στελέχη του ζυμομύκητα *Saccharomyces cerevisiae* strain LAS02, με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση της μονιλίας και της τεφράς σήψης σε διάφορες καλλιέργειες. Η δράση του *S. cerevisiae* strain LAS02 οφείλεται στην ικανότητά του να αποικεί γρήγορα στις επιφάνειες των φυτικών ιστών και έτσι να ανταγωνίζεται τα παθογόνα εμποδίζοντας την εξάπλωσή τους σε καρπούς και πληγές.

Αριθμός Άδειας  
Διάθεσης στην Αγορά  
(ΑΑΔΑ):  
60885/28-08-2019

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** *Saccharomyces cerevisiae*, strain LAS02: 96,1% β/β  
Ισοδύναμο με min  $1 \times 10^{13}$  CFU/kg

**ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:** 3,9 % (β/β)

**ΜΟΡΦΗ:** Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)

**Δηλώσεις επικινδυνότητας:** Περιέχει τον μικροβιακό παράγοντα *Saccharomyces cerevisiae*.

Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Δηλώσεις προφύλαξης:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε σκόνη. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή». «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό». Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ

Αρ. Παρτίδας, Ημερ/νια  
Παρασκευής: Βλ. επι συσκευασίας

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ : 5 kg**




Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην Αγορά: Ζύμες Λεσάφρ Ελλάς  
10ο χλμ. Αττικής Οδού - Θέση Αραιές Βελανιδιές - Ασπρόπυργος,  
Αθήνα 193 00, T: 210 55 80 240 E: zymes@zymes.gr



Κάτοχος Έγκρισης:  
Agrauxine 137 rue Gabriel Péri  
59700 Marcq-en-Baroeul France  
T: +33 (0)2 41 77 80 77



Αποκλειστικός Διαανομέας:  
ANTHESIS I.K.E.  
Εμ. Μηνάκην 8, 14561 Κηφισιά  
T 210 8012367, E info@anthesis.gr, www.anthesis.gr



2769\_0125\_FB

UFI (36A3-60YF-N006-98A0)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό μέχρι να σχηματιστεί ομοιόμορφο εναίωρημα. Προσθέστε το πυκνό διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Εφαρμόζεται μόνο του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δόσεις σκευάσματος

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                   | Σταθός                                      | ΥΠ<br>σλ./στρ | Όγκος<br>φασ.<br>Υγρού<br>λίτροι<br>στρ | Τρόπος και χρόνος<br>εφαρμογής                                                                                                             | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών<br>ανά καλλιεργητική<br>περίοδο.<br>Μεσοδιάστημα<br>εφαρμογών |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λιμένα<br>VITI<br>(ανανεώσιμα και εισαγόμενα<br>επιπράκτα)                                                                        | Τεφρά<br>Στήφη<br>Botrytis cinerea<br>BOTRC | 250           | 10-100                                  | Προληπτικές εφαρμογές από την<br>ένανξη της ανθοσύνης και μέχρι το στάδιο<br>της πλήρους ωρίμανσης των καρπών<br>BBCH 60 - 89              | 6/7                                                                                      |
| Ροδιόκων<br>PRNPS,<br>Εκλεκτικά<br>PRNAR,<br>Δασοπροστασία<br>PRNED                                                               | Φακιά<br>σφήκη (M-<br>nissla sp.)<br>MONSP  | 250           | 10-150                                  | Προληπτικές εφαρμογές από την<br>έκπτυξη των οφθαλμών και μέχρι την<br>πλήρη ωρίμανση των<br>καρπών BBCH 51 - 89                           | 8/7                                                                                      |
| Σταύρος<br>RUED,<br>Βετόκωπος<br>RUERT,<br>Μοσχο<br>Φυτοπροστασία<br>RIENL,<br>Μοσχο<br>VACMY,<br>Φυτοπροστασία<br>RIEUB<br>(Υ-4) | Τεφρά<br>Στήφη<br>Botrytis cinerea<br>BOTRC | 250           | 10-150<br>(Υ)<br><br>10-130<br>(Θ)      | Προληπτικές εφαρμογές από την<br>ένανξη εκκτύξης των πρώτων φυλλών<br>και μέχρι το στάδιο της πλήρους<br>ωρίμανσης των καρπών BBCH 12 - 89 | 8/7                                                                                      |

Δόσεις σκευάσματος

| Πεδίο Εφαρμογής                                                 | Σταθός                                   | ΥΠ<br>σλ./στρ | Όγκος (φασ.<br>Υγρού)<br>λίτροι/στρ | Τρόπος και χρόνος<br>εφαρμογής                                                                                                      | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών<br>ανά καλλιεργητική<br>περίοδο.<br>Μεσοδιάστημα<br>εφαρμογών |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τομάτα<br>LYPES<br>Μελιτζάνα<br>SOLME<br>Μπάμια<br>ABMES<br>(Θ) | Τεφρά Στήφη<br>Botrytis cinerea<br>BOTRC | 250           | 10-100                              | Προληπτικές εφαρμογές από την<br>έκπτυξη του 2ου φύλλου και μέχρι το<br>στάδιο της πλήρους ωρίμανσης<br>του καρπού BBCH 12 - 89     | 8/7                                                                                      |
| Πιπέρι<br>OPSN<br>(Θ)                                           | Τεφρά Στήφη<br>Botrytis cinerea<br>BOTRC | 250           | 10-100                              | Προληπτικές εφαρμογές από<br>την έκπτυξη του 2ου<br>φύλλου, και μέχρι το στάδιο<br>της πλήρους ωρίμανσης του<br>καρπού BBCH 12 - 89 | 8/7                                                                                      |
| Φράουλα<br>FRASS                                                | Τεφρά Στήφη<br>Botrytis cinerea<br>BOTRC | 250           | 10-130                              | Προληπτικές εφαρμογές από<br>την έκπτυξη του 2ου φύλλου και<br>μέχρι το στάδιο της<br>πλήρους ωρίμανσης του<br>καρπού BBCH 12 - 89  | 8/7                                                                                      |
| Κεράσι*<br>PRNAV<br>(Χρήση φασόνος σπασίας)                     | Φακιά σφήκη<br>(Monilia sp.)<br>MONSP    | 250           | 10-150                              | Προληπτικές εφαρμογές από την<br>έκπτυξη των οφθαλμών και μέχρι την<br>πλήρη ωρίμανση των καρπών<br>BBCH 51 - 89                    | 8/7                                                                                      |
| Λευκάνθος*<br>ATIDE<br>(Χρήση φασόνος σπασίας)                  | Τεφρά Στήφη<br>Botrytis cinerea<br>BOTRC | 250           | 10-150                              | Προληπτικές εφαρμογές από την<br>ένανξη της ανθοσύνης και μέχρι το στάδιο<br>της πλήρους ωρίμανσης των καρπών<br>BBCH 60 - 89       | 6/7                                                                                      |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.

3. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

4. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά της Φακιάς σφήκης είναι μέτρια και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην κερασιά και στο ακτινίδιο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μικητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με βάση επιλεγμένα στελέχη του ζυμομύκητα *Saccharomyces cerevisiae* strain LAS02, με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση της μόνιλης και της τεφράς στήφης σε διάφορες καλλιέργειες. Η δράση του *S. cerevisiae* LAS02 οφείλεται στην ικανότητά του να αποικει γρήγορα στις επιφάνειες των φυτικών ιστών και έτσι να ανταγωνίζεται τα παθογόνα εμποδίζοντας την εξάπλωσή τους σε καρπούς και πηλές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΙΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. *Saccharomyces cerevisiae* strain LAS02 η οποία ανήκει στην ομάδα BM02 κατά FRAC. Δρα σε πολλαπλά σημεία και δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Μπορεί να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μικητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αυτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και την ημέρα της συγκομιδής. Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRL's): Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRL's (ANEX IV του Καν. 396/2005)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν παρατηρηθεί οφθαλμικός ερεθισμός συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Απομακρύνετε τον παθόντα από την πηγή έκθεσης. Ζητήστε ιατρική συμβουλή ή να χρειαστείτε.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή ή να χρειαστείτε. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. ΥΠΙ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777  
ΥΠΙ (36A3-60YF-N006-984Q)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία  $\leq 20^{\circ}\text{C}$ , προστατευμένο από άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τρία 3 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ : 5 kg

2769\_0125-BB