

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Περιέχει τον μικροβικό παράγοντα *Bacillus subtilis* στέλεχος IAB/BS03. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υποψήφια με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες. **ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή». «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό». Διάδοση του περιεχομένου/περίεκτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λειοδότησες επιφανείες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, μην απορρίπτετε απευθείας στο επιφανειακά ύδατα, το διάλυμα απορρόσας από υδροτοκινικές καλλιέργειες θερμοκηπίων. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν αφεκστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΑ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕ ΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους μετά από 5 λεπτά, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο οφθαλμικός ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Βγάλτε τα λερωμένα με το σκεύασμα ρούχα και πλύντε τα με απορρυπαντικό και νερό πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναισθητό άτομο.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ

Το σκεύασμα περιέχει τη δ. ο. *Bacillus subtilis* strain IAB/BS03 που ανήκει στην ομάδα **BM02** κατά **FRAC**. Δύο σε πολλά κράτη και δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μικροκτόνα με εξεδικασμένο τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αυτά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του απορροστική συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποφευχθούν θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 20 °C.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με ζεστό νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συσκευασίας: Τα κενά υπό συσκευασία (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση σε κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν χρησιμοποιούνται με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

SeivontTM

Μικητοκτόνο σκεύασμα για τον έλεγχο διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών σε υπαίθριες και θερμοκηπτικές καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: *Bacillus subtilis* στέλεχος IAB/BS03: 0,81% β/β (min. 1 x 10⁸ ζώντα σπορίδια/ml (CFU/ml))
Βοηθητικές ουσίες: 99,19% β/β
Μικροβιακό σκεύασμα - Βακίλος
Τρόπος δράσης: FRAC BM02

Αριθμός Αδείας Διάθεσης στην Αγορά Α.Α.Δ.Α.: 61168

Ημερομηνία χορήγησης: 03.07.2024

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΛΑΓΙΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΜΕΤΕΧΝΕΣ

Αρ. Παρτίδας:
Ημερ.Παραγωγής:
Ημερομηνία λήξης: 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

SEIPASA S.A.
C/ Almudévar, 2
E-22240 Tardienta (Huesca) SPAIN
www.seipasa.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:



ANTHESIS I.K.E.
Εμμανουήλ Μπενέκη 8
14561, Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ: 210 80 123 67 • www.anthesis.gr



Περιεχόμενο:

1 λίτρο



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μικητοκτόνο σκεύασμα για τον έλεγχο διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών σε υπαίθριες και θερμοκηπτικές καλλιέργειες. Το στέλεχος *Bacillus subtilis* strain IAB/BS03 δρα με τρεις διαφορετικούς τρόπους έναντι των παθογόνων μυκήτων: • ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τα παθογόνα, για το χώρο και τα θρεπτικά συστατικά, μέσω των σποικίων που αναπτύσσονται στην επιφάνεια φύλλων του φυτού. • παράγει και απελευθερώνει λιποπεπτίδια τα οποία σκίζουν την διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών των μυκήτων, καταστρέφοντας τους βλαστικούς σωλήνες και το μυκήλιο τους. • επάγει την άμυνα των φυτών (διεγείρει την παραγωγή PR-1 πρωτεΐνης, η οποία είναι ικανή να αποδοθεί μυκηλιακές δομές).

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
		κ.ε./ στρέμμα (max.)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρω/ στρέμμα	
Αμπέλι (ονοποτήσιμο και επιτραπέζιο)	Βοτρίτης <i>Botrytis cinerea</i>	100-300	20-100	Από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή BBCH 68-89
Τομάτα (Υ+Θ) Μελιτζάνα (Υ+Θ)	Βοτρίτης <i>Botrytis cinerea</i>	100-300	50-100	Από την έναρξη της άνθησης ως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 61-89
Πιπεριά (Υ+Θ)	Βοτρίτης <i>Botrytis cinerea</i>	100-300	70-100	Από την έναρξη της άνθησης ως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 61-89
Βότανα και βρώσιμα άνηθ: Φραγκομαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Μαιντανός, Φασκόμηλο, Δενδρολίβανο, Θυμαρί, Βασιλικός, Λάνη/ Δασνόφυλλα, Δρακόντιο/Εστραγκόν	Βοτρίτης <i>Botrytis cinerea</i> (Υ+Θ) ³	100-300	40-100	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως το τέλος της άνθησης BBCH 12-67
	Περωνόσπορος <i>Bremia</i> sp. (Υ) ³			
Ξέλλο (Υ+Θ)	Βοτρίτης <i>Botrytis cinerea</i>	100-300	20-100 (Υ) 40-100 (Θ)	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 12-49
Καλλιέργειες νεαρών φυλλών (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ+Θ)	Βοτρίτης <i>Botrytis cinerea</i>	100-300	80-100 (Υ) 40-100 (Θ)	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 12-49
Ανθοκράμβες (Υ): Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Κεφαλότις κράμβες (Υ): Άρανα, Λαχανάκια (Υ) Βρυξελλών	Βοτρίτης <i>Botrytis cinerea</i>	100-300	80-100	Από την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου έως όπου η κεφαλή φθάσει στο 70% του μεγέθους BBCH 14-47
Αγκινάρα (Υ)	Περωνόσπορος <i>Bremia</i> sp.	100-300	40-100	Από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως τον πλήρη σχηματισμό ανθοστάξις BBCH 11-59
Μαρούλι (Υ), και σαλατικά (Υ): Λυκοτριβόλο, Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα ανθία, Κάρδαμο και άλλα βλαστάκια και φύτες, Ρόκα	Περωνόσπορος <i>Bremia</i> sp.	100-300	40-100	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 12-49
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Νιθίο <i>Erysiphe</i> sp. <i>Sphaerotheca</i> sp.		100-300	50-100	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 12-89
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα	Νιθίο <i>Erysiphe</i> sp. <i>Sphaerotheca</i> sp.	100-300	40-100	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 12-89
Καπνός	Νιθίο <i>Erysiphe</i> sp. <i>Sphaerotheca</i> sp.	100-300	40-100	Από την ανάπτυξη του 2ου πραγματικού φύλλου έως την έναρξη της άνθησης BBCH 12-59
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μοσχομουλιά, Ιαπωνική Μοσχομουλιά	Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> sp.	100-300	30-100	Από το στάδιο της ρόδης κορυφής έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 57-89
Αμυγδαλιά	Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> sp.	100-300	30-100	Από την εμφάνιση ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 51-89

Παρατηρήσεις: 1. Ξεκινήστε τις εφαρμογές προληπτικά όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 2. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα με το παθογόνο. 3. Εφαρμόζεται σε υπαίθριες και θερμοκηπτικές βότανα και βρώσιμα άνηθ. 4. Εφαρμόζεται σε υπαίθριες βότανα και βρώσιμα άνηθ. 5. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα ενώ όταν είναι υψηλή να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για θερμοκηπτικές χρήσεις: 0 (μηδέν) ημέρες για όλες τις εγκεκριμένες καλλιέργειες, ενώ για τα καπνά δεν ορίζεται. **Μεγιστός αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια/περίοδο:** 5 εκτός από ΜΗΛΟΕΙΔΗ και Αμυγδαλιά με 7. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 5-7 ημέρες. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:** και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Μην εισερχόσθε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Ξεπλύνετε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη τρεις (3) φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ρύθμιση του ψεκαστικού υγρού σε pH 5-7. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.