

MISTER P

Φερομόνη για την Παρεμπόδιση Σύζευξης του Ανθομήτη
(*Prays citri*) στην πορτοκαλιά & μανταρινιά
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 9112/20-04-2025
ΑΕ (αερόλυμα, αεροζόλ)

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εγγυημένη σύνθεση - Δραστική ουσία:
(Z)-7-Tetradecenal: 5,4 % B/B ή 54 g/kg
Βοηθητικές ουσίες 94,31 % B/B

Δηλώσεις επικινδυνότητας: Εξοικειωθείτε εύκολα αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, οπινθίδες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην πετάτε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τη χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα στομαχικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις ληθισμένες επιφάνειες και τους δρόμους.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φραγμοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση δηλητηρίασης:** καλέστε γιατρό για τη συνθήκες πρώτες βοήθειες.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμογές συμπτωματικής θεραπείας.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777

UFI: R770-FOXV-Q00J-79RH

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ANDERMATT - ANTHESIS ΙΚΕ
Εμ. Μενεκάν 8, 14561 Κηφισιά
Τ 210 8012367, E info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 275g



Andermatt
Anthesis

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Φερομόνη για την παρεμπόδιση της σύζευξης του Ανθομήτη (*Prays citri*) με τεχνική διακοπής ζευγαρώματος. Τα αρσενικά *Prays citri* ακολουθούν τη βαθμίδα συγκέντρωσης της ειδικής για το είδος φερομόνης στον αέρα για να προσανατολιστούν προς τα θηλυκά για ζευγάρωμα τη διαταραχή και τελικά την παρεμπόδιση σύζευξης.

Τρόπος εφαρμογής: Αναρτήστε τη συσκευή σε κλαδί ή πάσσαλο στο ανώτερο 1/3 της κόμης του δέντρου και ένα μέτρο μακριά από καρπούς. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα χρησιμοποιούμενα δοχεία (κάνιστρα) μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής, Στόχος, Σκεύασμα (Δοχεία) / 10 στρέμματα, Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ: Ανθομήτης *Prays citri*. 1-2 Δοχεία (κάνιστρα) για 10 στρ. Πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων αγκυρίων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργη/κή περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τοποθετείτε τα δοχεία του προϊόντος (κάνιστρα) στην συσκευή αυτομάτως διάχυσης πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων αγκυρίων του εντόμου.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείτε παγίδες παρακολούθησης, ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις και συμβουλευτείτε τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν τα δοχεία (κάνιστρα) πριν αρχίσει η πτήση των αγκυρίων της γενιάς που διαχειμάζει.

3. Μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει όλη την καλλιεργητική περίοδο, ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση των 59,4 γρ. δ.ο./10 στρέμματα ανά καλλιεργητική περίοδο (έως 2 δοχεία σκευάσματος /10 στρέμματα).

5. Μετά τον προγραμματισμό και την τοποθέτηση των απαιτούμενων συσκευών αυτόματης διάχυσης, σύμφωνα με την συνιστώμενη δόση (ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής), ενεργοποιήστε το MISTER P.

6. Τοποθετήστε ομοιόμορφα τα δοχεία του MISTER P μέσα στο αγροτεμάχιο, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συγκέντρωση της φερομόνης, όπως ο άνεμος, η τοπογραφία, η διάταξη των φυτών και η πιθανότητα προσβολών από γειτονικούς οπωρώνες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογυγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλείται:

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλους οπωρώνες ή όταν το σκεύασμα τοποθετείται σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατευθούν ακόμα και μικροί οπωρώνες, όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων ή όταν οι γειτονικοί οπωρώνες ακολουθούν επίσης παρόμοια προγράμματα αντιμετώπισης του εντόμου. Οπωρώνες με χαμηλούς πληθυσμούς εντόμων, προστατεύονται επαρκώς με το MISTER P. Σε αγρούς με μεσαίους και υψηλούς πληθυσμούς είναι απαραίτητη η συνδυασμένη εφαρμογή συγκεκριμένων εντομοκτόνων, ειδικά το πρώτο έτος και στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, για να μειωθεί ο πληθυσμός του εντόμου.

Η συνδυασμένη χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του MISTER P.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τελεία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: μη εφαρμοσμένη.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική αραβίαση συσκευασίας του, σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

BIOGARD
biological first



EL

Rev. 04-2025

520 3