

NeemAzal®-T/S

Πλεονεκτήματα

Διαχείριση εχθρών

- ✓ Αποτελεσματικός έλεγχος σε μεγάλο εύρος εχθρών-στόχων
- ✓ Άμεση διακοπή διατροφής εντόμων (σταματά αμέσως η εξάπλωση της ζημιάς) και θανάτωση σε σύντομο χρονικό διάστημα (2-7 ημέρες)
- ✓ Διασυστηματική / Διελασματική κίνηση στο φυτό
- ✓ Εκλεκτική δράση σε εχθρούς-στόχους
- ✓ Συμβατό με τη χρήση ωφέλιμων μακροοργανισμών

Διαχείριση Υπολειμμάτων

- ✓ Μικρό διάστημα αναμονής πριν την συγκομιδή (PHI: 3 ημέρες)
- ✓ Απαραίτητο εργαλείο για Προγράμματα Μηδενικών Υπολειμμάτων
- ✓ Συμβατό για χρήση στην Βιολογική Γεωργία

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

- ✓ Πολυδιάστατος τρόπος δράσης
- ✓ Η δραστική ουσία NeemAzal® είναι ένα σύνθετο μείγμα πολυάριθμων δραστικών ουσιών (λιμονοειδών)
- ✓ Δεν έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη Ανθεκτικότητας στο NeemAzal®

«Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.»

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Azadirachtin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. ΑΑΔΑ: 14776 / 04.06.2021.



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ANDERMATT - ANTHESIS IKE: Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά Τ 210 8012367 Ε info@anthesis.gr www.anthesis.gr

Trifolio-M

Κάτοχος της Έγκρισης

NeemAzal®-T/S

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
ΜΕ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ



Azadirachtin A: 1%



Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΖΑΔΙΡΑΧΤΙΝΗ
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΑ: 14776 / 04.06.2021



NeemAzal®-T/S

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Azadirachtin A: 1% β/ο




Τι είναι το NeemAzal T/S;

Το NeemAzal® T/S είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου που παρουσιάζει διασυστηματική / διελασματική κίνηση μέσα στα φυτά. Η δραστική του ουσία (NeemAzal®) που είναι σύνθετο μείγμα πολυάριθμων δραστικών ουσιών - λιμονοειδών, είναι το εξευγενισμένο προϊόν που προκύπτει από την πατενταρισμένη και αυστηρά τυποποιημένη διαδικασία της Trifolio-M. Προέρχεται από την εκχύλιση των σπόρων του τροπικού φυτού *Azadirachta indica*, (δέντρο Neem). Το τυποποιημένο σκεύασμα NeemAzal® T/S χρησιμοποιεί την πολυδύναμη δραστική ουσία NeemAzal® και τις πιο σύγχρονες βοηθητικές ουσίες που του προσδίδουν άριστη αποτελεσματικότητα, και σταθερότητα στην ακτινοβολία UV.

Τρόπος Δράσης

Το NeemAzal® T/S δρα μέσω επαφής και κατάποσης ως ρυθμιστής ανάπτυξης. Παρεμβαίνει στην εξέλιξη των εντόμων στα ατελή στάδια, παρεμποδίζοντας την σύνθεση εκδυσόνης (ορμόνη που ελέγχει την έκδυση). Η εφαρμογή του NeemAzal® T/S επιφέρει άμεση διακοπή διατροφής των εντόμων και μείωση της γονιμότητας τους, ενώ παρουσιάζει και απωθητικές ιδιότητες.



ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

NeemAzal®-T/S

Biogarden



Εντομοκτόνο Φυσικής Προέλευσης



Δένδρο Neem



Καρποί Neem



Σπόροι Neem



Αποφλυωμένοι
σπόροι Neem



Εκκύλιση



NeemAzal®



NeemAzal® - T/S
1% Azadirachtin A

Φάσμα Δράσης

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υγναίθρου)
Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*), Πράσινο Σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκνήσου)
Αθευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*), Φυλλοκνήστες (*Tuta absoluta*, *Liriomyza sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υγναίθρου + Θερμοκνήσου)
Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*). Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θερμοκνήσου)
Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), Αθευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ
Αφίδες (*Myzus persicae*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

ΜΗΛΙΑ
Αφίδες (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*, *Eriosoma lanigerum*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

ΑΜΠΕΛΙ (Μόνο επιτραπέζιες ποικιλίες)
Τζιτζικάνια (*Empoasca vitis*, *Scaphoideus titanus*), Κοκκοειδή (*Pulvinaria vitis*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος από την έκπτυξη του πρώτου φύλλου μέχρι την έναρξη της άνθισης (BBCH 11-59), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ/στρέμμα. 150-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα / στρέμμα.

ΦΡΑΟΥΛΑ (Υγναίθρου)
Αφίδες (*Aphis sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι την εμφάνιση του 1ου θυγατρικού φυτού και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι τη συγκομιδή του 2ου χειριού (οι περισσότεροι καρποί έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 11-42 και 70-89), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ/στρέμμα. 150-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα / στρέμμα.

ΠΕΠΟΝΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υγναίθρου)
Αφίδες (*Aphis gossypii*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την έναρξη της άνθισης και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού (BBCH 40-59 και 70-89), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ/στρέμμα. 150-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα / στρέμμα.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υγναίθρου)
Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), Αθευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*) Πράσινο Σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Θερμοκνήσου)
Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), Αθευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*) Φυλλοκνήστες (*Liriomyza sp.*, *Phytomyza sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ησ.Σημ.)*. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κοκκοκθάκι (Θ), Ροδακινιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Καλλωπιστικά (Υ+Θ): 3, Αμπέλι (μόνο επιτραπέζιες ποικιλίες): 2-3, Φράουλα (Υ), Πεπόνι (Υ), Κοκκινόψα (Υ), Καρπούζι (Υ): 2

Παρατηρήσεις:
1. Να εφαρμόζετε κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας.
2. Να ψεκάζετε απουσία ανέμου.
3. Η δόση μεταξύ 200-300 κ.εκ. ανά στρέμμα εξαρτάται από το επίπεδο της προσβολής.
4. Πριν τη χρήση του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.
5. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεξιμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: τομάτας (Υ+Θ), πιπεριάς (Υ+Θ), μελιτζάνας (Υ+Θ), αγγουριού (Θ), κολοκυθίου (Θ), πεπονιού (Υ), καρπούζι (Υ), κολοκύθας (Υ), ροδακινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αμπελιού, φράουλας (Υ) και καλλωπιστικών (Υ+Θ). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Azadirachtin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη και φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή».
«Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανέσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό».
Δάβετε του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφίσσετε από τα επιφανειακά ύδατα:
• μια απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης για πρώιμες εφαρμογές ή 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης για όψιμες εφαρμογές σε καλλιέργειες μπλοκίων πυρνοκαρπών.
• μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε καλλιέργειες καλλωπιστικών, αμπελιού, φράουλας, πεπονιού, κολοκύθας και καρπούζι.
• μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθίου.
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφίσσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:
• 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκατικού νέφους κατά 80% σε καλλιέργειες μπλοκίων και πυρνοκαρπών.
• 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών της διασποράς του ψεκατικού νέφους κατά 30% σε καλλιέργειες καλλωπιστικών.
• 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκατικού νέφους κατά 95% στην καλλιέργεια του αμπελιού.
• 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών της διασποράς του ψεκατικού νέφους κατά 80% στις καλλιέργειες φράουλας, πεπονιού, κολοκύθας και καρπούζι.

*Για περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του NeemAzal T/S συμβουλευτείτε την ετικέτα του.