

NeemAzal-T/S

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Azadirachtin A 1% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 96% β/β

ΑΑΔΑ: 14776 / 04.06.2021

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με δισυστηματική δράση
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις,



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με δισυστηματική δράση. Η δραστική του ουσία είναι προϊόν εκχύλισης των σπόρων του τροπικού φυτού *Azadirachta indica*, δέντρο του Νημ (Neem). Δρα μέσω επαφής και κατάποσης ως ρυθμιστής ανάπτυξης, παρεμβαίνοντας στην εξέλιξη των εντόμων στα ατελή στάδια. Παράλληλα, παρεμποδίζει την σύνθεση εκδυσάνης (ορμόνη που ελέγχει την έκδυση). Έχει επίσης αντιτροφικές και απωθητικές ιδιότητες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος σε ποσοστό 20-50%. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς. Για καλύτερα αποτελέσματα, το pH του ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να διατηρείται όξινο (pH 4,5-6). Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και υπό συνεχή ανάδευση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Το νερό μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ):

• ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υγαιθρου)

Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*), Πράσινο Σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σπιντόπτερα (*Spodoptera exigua*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκνήπιο)

Αφίδες (*Myzus persicae*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*), Φυλλόκηκες (*Tuta absoluta*, *Liriomyza sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υγαιθρου + Θερμοκνήπιο)

Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θερμοκνήπιο)

Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Αφίδες (*Myzus persicae*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΜΗΛΙΑ

Αφίδες (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*, *Eriosoma lanigerum*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΑΜΠΕΛΙ (Μόνο επιτραπέζιες ποικιλίες)

Τζιτζυκάνια (*Empoasca vitis*, *Scaphoideus titanus*), Κοκκοειδή (*Pulvinaria vitis*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του πρώτου φύλλου μέχρι την έναρξη της άνθησης BBCH 11-59 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ/στρέμμα. 150-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα /στρέμμα.

• ΦΡΑΟΥΛΙΑ (Υγαιθρου)

Αφίδες (*Aphis sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι την εμφάνιση του 1ου θυγατρικού φυτού και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι τη συγκομιδή του 2ου χειριού (οι περισσότεροι καρποί έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας) BBCH 11-42 και 70-89 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ/στρέμμα. 150-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα / στρέμμα.

• ΠΙΠΕΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υγαιθρου)

Αφίδες (*Aphis gossypii*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την έναρξη της άνθησης και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού. BBCH 40-59 και 70-89, με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ/στρέμμα. 150-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα / στρέμμα.

• ΚΑΛΑΔΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υγαιθρου)

Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*) Φυλλόκηκες (*Lyriomyza sp.*, *Phytomyza sp.*), Σπιντόπτερα (*Spodoptera exigua*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Θερμοκνήπιο)

Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips sp.*) Φυλλόκηκες (*Lyriomyza sp.*, *Phytomyza sp.*), *Spodoptera frugiperda* * (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 200-300 κ.εκ / στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα / στρέμμα.

• ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Ροδανθιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Καρπούζι (Υ+Θ): 3, Αμπέλι (μόνο επιτραπέζιες ποικιλίες): 2-3. Φράουλα (Υ), Πεπόνι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Καρπούζι (Υ): 2

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΒΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Ροδανθιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Καρπούζι (Υ+Θ), Αμπέλι επιτραπέζιο, Πεπόνι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Καρπούζι (Υ), Φράουλα (Υ): 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διασκέριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Azadirachtin A, εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα UN (compounds of unknown or uncertain MoA) κατά IRAC.

Το προϊόν δεν είναι συμβατό με προϊόντα ναύδ όξινος (π.χ όξινες αργίλους) ή πολύ αλκαλικής αντίδρασης (π.κ. πολυβιταμινούχο αλάτι, Βορβογέλιος ναύος κ.λ.π.).

Να μην προσορίζονται για μεταποίηση τα προϊόντα των καλλιέργειών επιτραπέζιου αμπελιού και φράουλας που έχουν δεχτεί εφαρμογή με το σκεύασμα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για ένα (1) χρόνο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να εφαρμόζεται κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας.
2. Να ψεκάζεται απουσία ανέμου.
3. Η δόση μετάφ. 200-300κ.εκ. ανά στρέμμα εξαρτάται από το επίπεδο της προσβολής.
4. Πριν τη χρήση του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.
5. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα.

Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεκτική η απουσία φυτοτοξικότητας.

*Δεν είναι τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: τομάτας (Υ+Θ), πιπεριάς (Υ+Θ), μελιτζάνας (Υ+Θ), αγγουριού (Θ), κολοκυθίου (Θ), πεπονιού (Υ), καρπούζι (Υ), κολοκύθας (Υ), ροδανθιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αμπελιού, φράουλας (Υ) και καλλωπιστικών (Υ+Θ). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Azadirachtin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Για να αποφευχθεί τους κινδύνους από την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Φυλάσσετε κλειδωμένα. Μακριά από παιδιά.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη και φόρτωση και ολόκληρη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη, φόρτωση και εφαρμογή.

«Φοράτε μακρινόμο ποικίμο και μακριά παντελόνι κατά την επανεισκόδοση στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό». Διάδοση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τα συσκευασίας του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις ληιστώματες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφιέρτε από τα επιφανειακά ύδατα:

• μια αμέσωση ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσκασης για πρώιμες εφαρμογές ή 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσκασης για ώριμες εφαρμογές σε καλλιέργειες μηλοειδών πυρηνοκάρπων.

• μια φυτική ζώνη ανάσκασης 20 μέτρων σε καλλιέργειες καλλωπιστικών, αμπελιού, φράουλας, πεπονιού, κολοκύθας και καρπούζιού.

• μια φυτική ζώνη ανάσκασης 10 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθίου.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφιέρτε μια αμέσωση ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

• 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% σε καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων.

• 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 30% σε καλλιέργειες καλλωπιστικών.

• 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95% στην καλλιέργεια του αμπελιού.

• 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% στις καλλιέργειες φράουλας, πεπονιού, κολοκύθας και καρπούζιού.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΣ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΑΝΤΙΔΟΣ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΗΣΕΩΝ: 210-7793777

Trifolio-M
Hoehne Biosubstanzen

Andermatt
 Anthesis

Κάτοχος της άδειας: Trifolio-M GmbH
 Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lahnhau, Γερμανία
 Contact person: Dr. Kerstin Jung
 Tel: +49 6441 209 77 27 e:kerstin.jung@trifolio-m.de

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
 ANDERMATT – ANTHESIS IKE
 Ερ. Μενειάν 8, 145-61 Κηφισιά
 Τ: 210 80 12 367, info@anthesis.gr www.anthesis.gr

Αρ. Παρτίδας – Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1L